



L.B.M. ZTP  
7 rue Raymond Lefebvre  
93170 BAGNOLET

**Info Biopsie Testiculaire**

Ref : A-C1-ENR-028-02  
Version : 02  
Applicable le : 21-06-2016



**CFEP - Centre de Fertilité de l'Est Parisien**

30, rue Floréal - 93170 Bagnolet Cedex  
Depuis 1985 - [www.amp93.com](http://www.amp93.com)

**CENTRE DE FECONDATION IN VITRO**  
**Unité de Médecine de la Reproduction**



**Gynécologues Agréées**

Dr G.J BERTHELOT  
Dr A. FUBINI  
Dr JP KUTNER  
Dr JP LABOURIER  
Dr A. MENARD  
Dr R. MURCIANO  
Dr R. REGHIS

**Biologistes Agréées (Laboratoire ZTP)**

Dr J PFEFFER (Coordinateur)  
Dr JP TAAR (Responsable AMP Vigilance)  
Dr I. HEILIKMAN

**Urologues**

Dr M. BARKA  
Dr F. GUILLEMINOT

**INFORMATION aux PATIENTS : la BIOSPIE TESTICULAIRE et/ou la PONCTION EPIDYDMAIRE**

Monsieur,

Votre praticien autorisé vous a proposé un acte opératoire de type Biopsie testiculaire et/ou Ponction épidydimaire.

Une **BIOPSIE TESTICULAIRE** consiste en un prélèvement de pulpe testiculaire :

- pour analyse anatomopathologique (histologie) à la recherche de cellules tumorales et de cellules de la lignée spermatique → **LABORATOIRE spécialisé d'ANATOMOPATHOLOGIE**
- une recherche de spermatozoïdes → **LABORATOIRE de FECONDATION In VITRO ZTP**

Elle permet donc de retrouver et de conserver des spermatozoïdes (s'ils sont assez nombreux) pour permettre une possibilité de grossesse(s) ultérieure(s).

L'intervention peut être réalisée généralement sous anesthésie générale.

L'intervention est effectuée par une ouverture cutanée au niveau de la partie médiane des bourses entre les deux testicules. Dans la plus part des cas les fils sur la peau sont résorbables.

Selon les cas, la biopsie peut être uni ou bilatérale. (*Le chirurgien vous précisera le type d'intervention qu'il prévoit pour vous en accord avec le gynécologue du centre de PMA.*)

L'intervention comporte une incision du testicule sur quelques millimètres pour prélever quelques grammes de pulpe testiculaire, lieu où sont formés les spermatozoïdes.

L'opération ne demande aucun traitement médical.

L'intervention est réalisée en ambulatoire (*vous rentrerez à la Clinique le matin à jeun. Vous retrouverez votre chambre ... environ 2H après l'intervention et vous pourrez sortir rapidement le r si votre état le permet et si quelqu'un vient vous chercher.*)

**Les résultats de l'intervention vous seront donnés par le praticien à l'origine de la prise en charge initiale (urologue ou gynécologue PMA)**

(*La recherche de spermatozoïde est extemporanée et la congélation est faite le même jour ; Les résultats histologiques nécessitent environ 10jours*)



## COMMENT SE DÉROULE L'HOSPITALISATION ?

Avant l'opération: Une consultation pré-anesthésique est réalisée au plus tard 48h avant l'intervention. Vous serez hospitalisé le jour de l'intervention, il est important d'être à jeun conformément aux consignes qui vous seront données..

Vous serez conduit au bloc opératoire, l'anesthésie sera réalisée. Il est indispensable de ne prendre aucun médicament contenant de l'aspirine dans les 10 jours avant et après l'intervention.

Après l'opération: Vous passerez en salle de réveil où la surveillance postopératoire sera faite, avant de retourner dans votre chambre.

La perfusion intraveineuse est laissée en place pendant 4-6 heures en fonction du retour à votre état habituel. Une surveillance régulière est effectuée à la recherche de complications (hématome)

La prévention d'une phlébite des membres inférieurs est assurée par un lever précoce.

La reprise d'une alimentation normale se fait en général dès le retour en chambre si vous le souhaitez . La sortie a généralement lieu vers la 3<sup>e</sup> heure après.

Il est recommandé d'attendre 10 jours après l'opération pour reprendre une activité sexuelle et 3 semaines pour la reprise du sport après votre retour à domicile,

Si des douleurs, des saignements, des vomissements, de la fièvre, une douleur dans les mollets ou toute autre anomalie apparaissent, il est indispensable de consulter votre médecin généraliste ou de contacter la Clinique ou l'urologue qui vous a opéré.



## QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES D'UNE BIOPSIE TESTICULAIRE ?

Aucune séquelle n'est à attendre de l'intervention, hormis la cicatrice. Cependant, il est souhaitable de respecter un délai de cicatrisation entre l'intervention et la reprise du travail (5-15 jours selon le métier). En effet la cicatrice réalisée sur les bourses peut provoquer une douleur pendant quelques jours imposant le port de slip plutôt que de caleçon pour maintenir les bourses lors des mouvements.

## LES RISQUES ET COMPLICATIONS DE L'INTERVENTION

La biopsie testiculaire est une intervention courante et bien réglée dont le déroulement est simple dans la majorité des cas. Très rares pendant l'opération, les complications peuvent apparaître en post opératoire :

*L'hématome de la bourse ou des bourses :*

*L'abcès de la cicatrice ou de la bourse*

*L'infection testiculaire ou orchite :*

*La phlébite des membres inférieurs et l'embolie pulmonaire :*

*Comme toute chirurgie, cette intervention peut comporter très exceptionnellement un risque vital ou être à l'origine de séquelles parfois graves*

